


**ΘΕΜΑ Α**

- A1.** Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι παραγωγίσιμες στο  $\mathbb{R}$ , να αποδείξετε ότι  $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$  **Μονάδες 7**
- A2.** Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα να δώσετε τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου  $A$ . **Μονάδες 4**
- A3.** Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής μεταβλητότητας μιας μεταβλητής  $X$ , αν  $\bar{x} > 0$  και πώς, αν  $\bar{x} < 0$ . **Μονάδες 4**
- A4.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- α.** Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για τη γραφική παράσταση ποσοτικών δεδομένων. (Μονάδες 2)
- β.** Η παράγωγος της  $f$  στο  $x_0$  εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του  $y = f(x)$  ως προς  $x$ , όταν  $x = x_0$ . (μονάδες 2)
- γ.** Αν  $A, B$  ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου  $\Omega$  με  $A \subseteq B$  τότε ισχύει ότι  $P(A) > P(B)$ . (μονάδες 2)
- δ.** Το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των τιμών μιας μεταβλητής είναι μέτρα διασποράς (μονάδες 2)
- ε.**  $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta_{\mu x} = \eta_{\mu x_0}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$  (μονάδες 2)

**Μονάδες 10**

**ΘΕΜΑ Β**

Οι χρόνοι (σε λεπτά) που χρειάστηκαν οι μαθητές μιας τάξης για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα ανήκουν στο διάστημα  $[5,45)$  και έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κλάσεις ίσου πλάτους. Τα δεδομένα των χρόνων εμφανίζονται στο παρακάτω ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό.



- B1.** Με βάση το παραπάνω ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό, να υπολογίσετε τη διάμεσο των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές. **Μονάδες 4**
- B2.** Στον επόμενο πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των χρόνων, να αποδείξετε ότι  $\alpha=8$  (μονάδες 3) και να μεταφέρετε τον πίνακα κατάλληλα συμπληρωμένο στο τετράδιό σας (μονάδες 5).

Χρόνοι	$x_i$	$v_i$	$f_i\%$	$N_i$	$F_i\%$
[5,.....)		$\alpha+4$			
[.....,.....)		$3\alpha-6$			
[.....,.....)		$2\alpha+8$			
[.....,45)		$\alpha-2$			
Σύνολο					

**Μονάδες 8**

- B3.** Να βρεθεί η μέση τιμή  $\bar{x}$  και η τυπική απόκλιση  $s$  των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές. (Δίνεται ότι:  $\sqrt{84} \approx 9,17$ ) **Μονάδες 8**
- B4.** Να βρεθεί το ποσοστό των μαθητών που χρειάστηκαν τουλάχιστον 37 λεπτά να λύσουν το μαθηματικό πρόβλημα. **Μονάδες 5**

### ΘΕΜΑ Γ

Από τους μαθητές μιας τάξης ενός σχολείου επιλέγουμε τυχαία έναν μαθητή. Αν  $n$  φυσικός αριθμός με  $n \geq 3$ , τότε η πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής να μαθαίνει

- Γαλλικά είναι  $\frac{3n}{n^2+1}$
- Ισπανικά είναι  $\frac{n+2}{n^2+1}$
- και τις δύο παραπάνω γλώσσες είναι  $\frac{n+1}{n^2+1}$
- μια τουλάχιστον από τις παραπάνω γλώσσες είναι ίση με το όριο  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(\sqrt{x^2+3}-2)}{x^2+x}$

- Γ1.** Να αποδείξετε ότι το ενδεχόμενο ο μαθητής να μαθαίνει μία τουλάχιστον από τις παραπάνω δύο γλώσσες είναι βέβαιο. **Μονάδες 7**
- Γ2.** Να αποδείξετε ότι  $n = 3$  **Μονάδες 6**
- Γ3.** Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής να μαθαίνει μόνο μία από τις δύο γλώσσες. **Μονάδες 6**
- Γ4.** Αν ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν και τις δύο παραπάνω γλώσσες είναι 32, να βρείτε τον αριθμό των μαθητών της τάξης. **Μονάδες 6**

### ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \frac{1 + \ln^2 x}{x}$ ,  $x > 0$

- Δ1.** Να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα. **Μονάδες 5**
- Δ2.** Έστω  $M(x, f(x))$ ,  $x > 0$  σημείο της γραφικής παράστασης της  $f$ . Η παράλληλη ευθεία από το  $M$  προς τον άξονα  $y'y$  τέμνει τον ημιάξονα  $Ox$  στο σημείο  $K(x, 0)$  και η παράλληλη ευθεία από το  $M$  προς τον άξονα  $x'x$  τέμνει τον ημιάξονα  $Oy$  στο σημείο  $\Lambda(0, f(x))$ . Αν  $O$  είναι η αρχή των αξόνων, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλόγραμμου  $OKML$  γίνεται ελάχιστο, όταν αυτό γίνει τετράγωνο. **Μονάδες 7**
- Δ3.** Έστω η ευθεία  $\varepsilon: y = \lambda x + \beta$ ,  $\beta \neq 10$ , η οποία είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο  $\Sigma(1, f(1))$ . Θεωρούμε δέκα σημεία  $(x_i, y_i)$ ,  $i=1, 2, \dots, 10$  της ευθείας  $\varepsilon$ , τέτοια ώστε οι τετμημένες τους  $x_i$  να έχουν μέση τιμή  $\bar{x} = 10$  και τυπική απόκλιση  $s_x = 2$ . Να βρείτε για ποιες τιμές του  $\beta$  το δείγμα των τεταγμένων  $y_i$  των δέκα σημείων είναι ομοιογενές. **Μονάδες 8**
- Δ4.** Αν  $A$  και  $B$  είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα, τέτοια ώστε  $A \neq \emptyset$  και  $A \cap B \neq \emptyset$  να αποδείξετε ότι  $f(P(A)) + f(P(A \cap B)) \geq 2f(P(A \cup B))$ . **Μονάδες 5**


### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

- A1.** Σχολικό βιβλίο σελ. 31  
**A2.** Σχολικό βιβλίο σελ. 148  
**A3.** Σχολικό βιβλίο σελ 96  
**A4.** α. Λ β. Σ γ. Λ δ. Σ ε. Σ

#### ΘΕΜΑ Β

**B1.**



Από το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων βλέπουμε ότι  $\delta = 25$ .

**B2.** Αφού η διάμεσος ταυτίζεται με το άνω όριο της δεύτερης κλάσης τότε :

$$v_1 + v_2 = v_3 + v_4 \Leftrightarrow \alpha + 4 + 3\alpha - 6 = 2\alpha + 8 + \alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha + 3\alpha - 2\alpha - \alpha = 6 - 4 + 8 - 2 \Leftrightarrow \alpha = 8.$$

Επομένως:

Χρόνοι	$x_i$	$v_i$	$f_i\%$	$N_i$	$F_i\%$
[5,15)	10	12	20	12	20
[15,25)	20	18	30	30	50
[25,35)	30	24	40	54	90
[35,45)	40	6	10	60	100
Συνολο	-	60	100	-	-

**B3.**  $\bar{x} = \frac{10 \cdot 12 + 20 \cdot 18 + 30 \cdot 24 + 40 \cdot 6}{60} = \frac{1440}{60} = 24$

$$s^2 = \frac{(10-24)^2 \cdot 12 + (20-24)^2 \cdot 18 + (30-24)^2 \cdot 24 + (40-24)^2 \cdot 6}{60} = \frac{2352 + 288 + 864 + 1536}{60} = \frac{5040}{60} = 84$$

Άρα  $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{84} \approx 9.17$

**B4.** Κατά την ομαδοποίηση υποθέτουμε ότι οι τιμές σε κάθε κλάση κατανέμονται ομοιόμορφα. Από 37 έως 45 λεπτά για να λύσουν το πρόβλημα χρειάζεται το  $\frac{8}{10} \cdot f_4\% = 8\%$  των μαθητών.

**Σχόλιο :** Το **B4** μπορεί να λυθεί και με όμοια τρίγωνα.

### ΘΕΜΑ Γ

Έστω τα ενδεχόμενα  $\Gamma$ : ο μαθητής μαθαίνει Γαλλικά και  $I$ : ο μαθητής μαθαίνει Ισπανικά.

**Γ1.**  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(\sqrt{x^2+3}-2)}{x^2+x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(\sqrt{x^2+3}-2) \cdot (\sqrt{x^2+3}+2)}{x(x+1) \cdot (\sqrt{x^2+3}+2)} =$   
 $= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x^2-1)}{x(x+1) \cdot (\sqrt{x^2+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x-1)(x+1)}{x(x+1) \cdot (\sqrt{x^2+3}+2)} = 1.$

Άρα  $P(\Gamma \cup I) = 1.$

Επειδή τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα  $\Gamma \cup I = \Omega$  άρα  $\Gamma \cup I$  είναι το βέβαιο ενδεχόμενο.

**Γ2.** Από προσθετικό νόμο έχουμε:

$$P(\Gamma \cup I) = P(\Gamma) + P(I) - P(\Gamma \cap I) \Leftrightarrow 1 = \frac{3v}{v^2+1} + \frac{v+2}{v^2+1} - \frac{v+1}{v^2+1} \Leftrightarrow$$

$$v^2+1 = 3v+1 \Leftrightarrow v^2-3v=0 \Leftrightarrow v(v-3)=0 \Leftrightarrow v=3.$$

**Γ3.** Επειδή  $(\Gamma \cup I) \cap (I \cup \Gamma) = \emptyset$  από απλό προσθετικό νόμο έχουμε

$$P((\Gamma - I) \cup (I - \Gamma)) = P(\Gamma - I) + P(I - \Gamma) = P(\Gamma) - P(\Gamma \cap I) + P(I) - P(I \cap \Gamma) = P(\Gamma) + P(I) - 2P(\Gamma \cap I) =$$

$$= \frac{9}{10} + \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

**Γ4.** Επειδή τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, από κλασικό ορισμό πιθανότητας έχουμε

$$P(\Gamma \cap I) = \frac{4}{10} \Leftrightarrow \frac{N(\Gamma \cap I)}{N(\Omega)} = \frac{4}{10} \Leftrightarrow \frac{32}{N(\Omega)} = \frac{4}{10} \Leftrightarrow N(\Omega) = 80$$

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.**  $f(x) = \frac{1 + \ln^2 x}{x}, x > 0$

Για κάθε  $x > 0$  η  $f$  παραγωγίζεται ως πράξεις παραγωγισίμων συναρτήσεων με :

$$f'(x) = \frac{2 \ln x - 1 - \ln^2 x}{x^2} = -\frac{(\ln x - 1)^2}{x^2} \leq 0$$

$x$	0	$e$	$+\infty$
$f'$		0	
$f$			

Επειδή η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = e$  η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $(0, +\infty)$

- Δ2.** Έχουμε  $K(x,0)$  και  $\Lambda(0,f(x))$  και  $f(x) > 0$  για κάθε  $x > 0$ .  
Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι  $E(x) = xf(x) = 1 + \ln^2 x$ ,  $x > 0$ .

$$E'(x) = \frac{2 \ln x}{x}. \quad E'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1, \quad E'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Η συνάρτηση  $E$  έχει ελάχιστο για  $x = 1$  το  $f(1) = 1$ . Άρα το ορθογώνιο είναι τετράγωνο.

- Δ3.** Έχουμε  $f'(1) = -1$ , άρα  $\lambda = -1$ .

Τότε  $\varepsilon: y = -x + \beta$ .

Επομένως  $\bar{y} = -\bar{x} + \beta = -10 + \beta$  και  $s_y = |-1|s_x = s_x = 2$ .

$$CV_y = \frac{s_y}{|\bar{y}|} = \frac{2}{|-10 + \beta|}.$$

$$\text{Αρκεί } CV_y \leq \frac{1}{10} \Leftrightarrow \frac{2}{|-10 + \beta|} \leq \frac{1}{10} \Leftrightarrow 20 \leq |-10 + \beta| \Leftrightarrow -10 + \beta \geq 20 \text{ ή } -10 + \beta \leq -20 \text{ άρα } \beta \geq 30 \text{ ή } \beta \leq -10.$$

Τελικά  $\beta \in (-\infty, -10] \cup [30, +\infty)$ .

- Δ4.** Επειδή  $A \neq \emptyset$  και  $A \cap B \neq \emptyset$  έχουμε ότι  $0 < P(A) \leq 1$  και  $0 < P(A \cup B) \leq 1$ .

$A \subseteq A \cup B$  άρα  $P(A) \leq P(A \cup B)$  και η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα, επομένως  $f(P(A)) \geq f(P(A \cup B))$  (1).

Ομοίως  $P(A \cap B) \leq P(A \cup B)$  και η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα  $f(P(A \cap B)) \geq f(P(A \cup B))$  (2).

Με πρόσθεση των (1) και (2) κατά μέλη έχουμε  $f(P(A)) + f(P(A \cap B)) \geq 2f(P(A \cup B))$

#### ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ • ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ • ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ • ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ • ΒΑΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ • ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ • ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ  
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ • ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ • ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ • ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ

εκπαιδευτικός οργανισμός

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ